

**CCE RF**

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 003

**KARNATAKA SECONDARY EDUCATION EXAMINATION BOARD, MALLESWARAM,  
BANGALORE – 560 003**

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮಾರ್ಚ್ / ಏಪ್ರಿಲ್ — 2015

**S. S. L. C. EXAMINATION, MARCH/APRIL, 2015**

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು

**MODEL ANSWERS**

ದಿನಾಂಕ : 06. 04. 2015 ]

 ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : **81-K**

Date : 06. 04. 2015 ]

 CODE No. : **81-K**

ವಿಷಯ : ಗಣಿತ

**Subject : MATHEMATICS**

( ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ / Kannada Version )

( ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ / New Syllabus )

( ಶಾಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ / Regular Fresh )

[ ಪರಮಾವಧಿ ಅಂಕಗಳು : 80

**[ Max. Marks : 80**

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉತ್ತರದ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
I. 1.	A	$\frac{8}{3}$	1
2.	C	1	1
3.	D	$\frac{1}{6}$	1
4.	B	2250	1
5.	B	- 2	1
6.	D	3	1
7.	A	5 ಮಾನಗಳು	1
8.	C	7	1

★ ★ ★

**RF-1017**

★ ★ ★

[ Turn over

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು								
II.										
9.	$210 = \boxed{2 \times 3 \times 5 \times 7}$ <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">2</td><td style="padding-left: 5px;">210</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">3</td><td style="padding-left: 5px;">105</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">5</td><td style="padding-left: 5px;">35</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;"></td><td style="padding-left: 5px;">7</td></tr> </table> $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2	210	3	105	5	35		7	1
2	210									
3	105									
5	35									
	7									
10.	$A \setminus B = \{2, 3, 4\}$	1								
11.	$C: V = \left(\frac{\sigma}{x}\right) \times 100$ $= \frac{4}{80} \times 100$ $\therefore CV = 5$	$\frac{1}{2}$								
12.	$f(x) = x^2 - 4$ $f(4) = 4^2 - 4$ $= 16 - 4$ $\therefore f(4) = 12$	$\frac{1}{2}$								
13.	$\frac{AX}{BX} = \frac{AY}{CY}$ $\frac{4}{BX} = \frac{1}{2}$ $\therefore BX = 8$	$\frac{1}{2}$								
14.	$x = 90^\circ$	1								
III. 15.	<p>ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ <math>3 + \sqrt{5}</math> ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿ</p> $3 + \sqrt{5} = \frac{p}{q}$ ಇಲ್ಲಿ, $p, q \in \mathbb{Z}$ . $q \neq 0$	$\frac{1}{2}$								
	$3 - \frac{p}{q} = -\sqrt{5}$ $\frac{3q - p}{q} = -\sqrt{5}$	$\frac{1}{2}$								
	$\Rightarrow -\sqrt{5}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ $\therefore \frac{3q - p}{q}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ	$\frac{1}{2}$								
	<p>ಆದರೆ, <math>-\sqrt{5}</math> ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವೈರುಧ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</p> $\therefore$ ನಮ್ಮ ಊಹೆ $3 + \sqrt{5}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು	$\frac{1}{2}$								
	$\Rightarrow 3 + \sqrt{5}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ	2								

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
16.	<p>ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ <math>n(P) = 55</math>.</p> <p>ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ <math>n(M) = 67</math>.</p> <p>ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ <math>n(P \cap M) = ?</math></p> <p>ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ <math>n(P \cup M) = 100</math></p> $n(P) + n(M) = n(P \cup M) + n(P \cap M)$ $55 + 67 = 100 + n(P \cap M)$ $n(P \cap M) = 122 - 100$ $n(P \cap M) = 22$ <p>ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</p> $= n(P) - n(P \cap M)$ $= 55 - 22$ $= 33.$ <p style="text-align: center;"><b>ಅಥವಾ</b></p> $n(U) = 700$ $n(A) = 200$ $n(B) = 300$ $n(A \cap B) = 100$ $n(A) + n(B) = n(A \cup B) + n(A \cap B)$ $200 + 300 = n(A \cup B) + 100$ $500 - 100 = n(A \cup B)$ $n(A \cup B) = 400$ $n(A \cup B)^c = n(A^c \cap B^c)$ $= n[U \setminus (A \cup B)]$ $= n(U) - n(A \cup B)$ $= 700 - 400$ $n(A \cup B)^c = 300$ <p>OR <math>n(A^c \cap B^c) = 300</math></p>	<p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math>     2</p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math>     2</p>
17.	<p>ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಕಗಳು : 1, 2, 3, 7, 8, 9</p> <p>a) 4-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು <math>{}^6P_4</math> ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬಹುದು</p> ${}^6P_4 = 6 \times 5 \times 4 \times 3$ ${}^6P_4 = 360.$	<p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p>

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು								
18.	<p>b) ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ :</p> <table border="1" data-bbox="379 376 759 495"> <tr> <td><math>T</math></td> <td><math>H</math></td> <td><math>Ten</math></td> <td><math>U</math></td> </tr> <tr> <td><math>{}^3P_1</math></td> <td><math>{}^4P_1</math></td> <td><math>{}^5P_1</math></td> <td><math>{}^2P_1</math></td> </tr> </table> <p>ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು <math>{}^2P_1</math> ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದು  ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು <math>{}^5P_1</math> ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದು  ನೂರರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು <math>{}^4P_1</math> ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದು  ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು <math>{}^3P_1</math> ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದು  ಒಟ್ಟು ವಿಧಗಳು = <math>{}^2P_1 \times {}^5P_1 \times {}^4P_1 \times {}^3P_1</math>  <math>= 2 \times 5 \times 4 \times 3</math>  <math>= 120.</math></p> <p><math>D = 35, n = ?</math>  <math>D = {}^nC_2 - n</math>  <math>35 = \frac{{}^nP_2}{2!} - n</math>  <math>35 = \frac{n(n-1)}{2} - n</math>  <math>35 = \frac{n^2 - n}{2} - n</math>  <math>35 = \frac{n^2 - 3n}{2}</math>  <math>n^2 - 3n - 70 = 0</math>  <math>n^2 - 10n + 7n - 70 = 0</math>  <math>n(n-10) + 7(n-10) = 0</math>  <math>n = 10</math> ಅಥವಾ <math>n = -7</math>  <math>n = -7</math> ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದರಿಂದ  <math>n = 10</math>  <math>\therefore</math> ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 10.</p>	$T$	$H$	$Ten$	$U$	${}^3P_1$	${}^4P_1$	${}^5P_1$	${}^2P_1$	$\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   2  $\frac{1}{2}$    $\frac{1}{2}$    $\frac{1}{2}$    $\frac{1}{2}$   2  $\frac{1}{2}$
$T$	$H$	$Ten$	$U$							
${}^3P_1$	${}^4P_1$	${}^5P_1$	${}^2P_1$							
19.	<p><math>S = \{ (1, 1), (1, 2), \dots \dots (1, 6)</math>  <math>(6, 1), (6, 2), \dots \dots (6, 6) \}</math>  <math>\therefore n(S) = 36.</math></p>	$\frac{1}{2}$								


**RF-1017**


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು																		
20.	<p>a) ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎರಡೂ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಟನೆ                      A ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿ  <math>A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}</math>  <math>n(A) = 6</math>  <math>P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}</math>  <math>P(A) = \frac{6}{36}</math>.</p> <p>b) ಎರಡೂ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ 5 ರ ಗುಣಕಗಳು ಬರುವ ಘಟನೆ :                      B ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿ  <math>B = \{(5, 5)\}</math>  <math>\therefore n(B) = 1</math>  <math>P(B) = \frac{n(B)}{n(S)}</math>  <math>\therefore P(B) = \frac{1}{36}</math>.</p> <p>X = 2, 4, 6, 8, 10</p> <table border="1" data-bbox="375 1182 826 1440"> <thead> <tr> <th>X</th> <th>D = X - <math>\bar{x}</math></th> <th>D<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>-4</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p><math>n = 5</math>                      <math>\sum D^2 = 40</math></p> $\bar{x} = \frac{\sum X}{n} = \frac{30}{5} = 6 \quad \therefore \bar{x} = 6$ $\sigma^2 = \frac{\sum D^2}{n} \text{ ಅಥವಾ ಪ್ರಸರಣ ವಿಚಲನೆ} = \frac{\sum D^2}{n}$ $= \frac{40}{5}$ $\therefore \text{ಪ್ರಸರಣ ವಿಚಲನೆ} = \sigma^2 = 8$	X	D = X - $\bar{x}$	D <sup>2</sup>	2	-4	16	4	-2	4	6	0	0	8	2	4	10	4	16	<p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2      2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2      2</p>
X	D = X - $\bar{x}$	D <sup>2</sup>																		
2	-4	16																		
4	-2	4																		
6	0	0																		
8	2	4																		
10	4	16																		

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
21.	<p>ಕರಣಿಗಳ ಕ್ರಮಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ. = 16</p> $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{3}{6}} = \sqrt[6]{8}$ $3\sqrt{5} = 5^{\frac{1}{3}} = 5^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{25}$ $\therefore \sqrt{2} \times 3\sqrt{5} = \sqrt[6]{8} \times \sqrt[6]{25}$ $= \sqrt[6]{200}.$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$   2
22.	<p> <math>\frac{\sqrt{6} + \sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{6} + \sqrt{3}}{\sqrt{6} + \sqrt{3}}</math>                     (ಅಕರಣೀಕಾರಕದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದೆ)                 </p> $= \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{3})^2}{6 - 3}$ $= \frac{6 + 3 + 2\sqrt{18}}{3}$ $= \frac{9 + 6\sqrt{2}}{3}$ $= \frac{3(3 + 2\sqrt{2})}{3}$ $= 3 + 2\sqrt{2}.$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$   2
23.	<p> <math>P(x) = x^3 - 3x^2 + ax - 10</math> ಆಗಿರಲಿ                      ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಕಾರ  <math>(x - 5)</math>, <math>P(x)</math> ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಬೇಕಾದರೆ,  <math>P(5) = (5)^3 - 3(5)^2 + a(5) - 10</math>  <math>0 = 125 - 75 + 5a - 10</math>  <math>0 = 5a + 40</math>  <math>5a = -40</math>  <math>a = -8.</math> </p>	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$   2



ಅಥವಾ

★ ★ ★

RF-1017

★ ★ ★




ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
25.	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p>ಸಾಧನೀಯ : <math>PE = QE</math></p> <p>ಸಾಧನೆ : <math>\Delta ABD</math> ಯಲ್ಲಿ,  <math>PE \parallel BD</math> <span style="float: right;">(<math>\because PQ \parallel BC</math>)</span>  <math>\therefore \frac{AP}{AB} = \frac{AQ}{AC} = \frac{PE}{BD}</math> <span style="float: right;">→ (i) (ಥೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯ)</span></p> <p>ಇದೇ ರೀತಿ, <math>\Delta ADC</math> ಯಲ್ಲಿ,  <math>\frac{AE}{AD} = \frac{AQ}{AC} = \frac{EQ}{DC}</math> <span style="float: right;">→ (ii)</span></p> <p>(i) ಮತ್ತು (ii) ರಿಂದ  <math>\frac{PE}{BD} = \frac{EQ}{DC}</math>  ಆದರೆ, <math>BD = DC</math> <span style="float: right;">(<math>AD</math> ಮಧ್ಯರೇಖೆ)</span>  <math>\therefore PE = EQ</math></p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div>	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$   2
26.	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p>ತ್ರಿಭುಜ <math>ABC</math> ಯಲ್ಲಿ,  <math>\hat{B} = 90^\circ</math>  <math>\therefore AC^2 = AB^2 + BC^2</math>  <math>13^2 = 5^2 + BC^2</math>  <math>BC^2 = 169 - 25</math>  <math>\therefore BC^2 = 144</math>  <math>BC = 12</math></p> <p><math>\cos \theta = \frac{\text{ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಬಾಹು}}{\text{ವಿಕರ್ಣ}} = \frac{BC}{AC}</math>  <math>\therefore \cos \theta = \frac{12}{13}</math></p> <p><math>\tan \theta = \frac{\text{ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು}}{\text{ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಬಾಹು}} = \frac{AB}{BC}</math>  <math>\therefore \tan \theta = \frac{5}{12}</math></p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>(ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯ)</p> </div> </div>	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$   2




RF-1017



ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
27.	<p> <math>A = (x_1, y_1) = (3, 10)</math>  <math>B = (x_2, y_2) = (5, 2)</math>  <math>C = (x_3, y_3) = (14, 12)</math> ಆಗಿರಲಿ.  <math>AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(5 - 3)^2 + (2 - 10)^2}</math>  <math>\therefore AB = \sqrt{4 + 64} = \sqrt{68}</math> ಮಾನಗಳು                      ಇದೇ ರೀತಿ,  <math>BC = \sqrt{(14 - 5)^2 + (12 - 2)^2} = \sqrt{81 + 100} = \sqrt{181}</math> ಮಾನಗಳು  <math>AC = \sqrt{(14 - 3)^2 + (12 - 10)^2} = \sqrt{121 + 4} = \sqrt{125}</math> ಮಾನಗಳು                      ಸುತ್ತಳತೆ = <math>AB + BC + AC</math>                      ಸುತ್ತಳತೆ = <math>\sqrt{68} + \sqrt{181} + \sqrt{125}</math>  <math>\therefore P = (\sqrt{68} + \sqrt{181} + \sqrt{125})</math> ಮಾನಗಳು                 </p>	1/2 1/2 1/2 1/2   2
28.	<p> <math>r = 3</math> ಸೆಂ.ಮೀ., <math>d = 8</math> ಸೆಂ.ಮೀ.                 </p> <div style="text-align: center;">  </div> <p> <math>PA</math> ಮತ್ತು <math>PB</math> ಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ.  <math>3</math> ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರುವ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ  <math>OP</math> ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ  <math>PA, PB</math> ಗಳನ್ನು ಎಳೆದು, ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ                 </p>	1/2 1/2 1   2



**RF-1017**


[ Turn over

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
29.	<p>ಸ್ಕೇಲ್ : 20 m = 1 cm            40 m = 2 cm            60 m = 3 cm            80 m = 4 cm            100 m = 5 cm            150 m = 7.5 cm</p> <p style="text-align: right;">ಲೇಕ್ಯಾಚಾರ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಕ್ಕೆ</p> 	$\frac{1}{2}$   $1\frac{1}{2}$   2
30.	<p><math>F = 6</math>  <math>V = 8</math>  <math>E = 12</math></p> <p><math>F + V = E + 2</math>  <math>6 + 8 = 12 + 2</math>  <math>14 = 14.</math></p>	$\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   2
IV. 31.	<p><math>T_3 = \frac{1}{7}, T_7 = \frac{1}{5}</math> ಹರಾತ್ಯಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪದಗಳು</p> <p><math>\therefore</math> ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ <math>T_3</math> ಮತ್ತು <math>T_7</math> ನೇ ಪದಗಳು 7 ಮತ್ತು 5 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p> $d = \frac{T_p - T_q}{p - q}$ $= \frac{T_7 - T_3}{7 - 3} = \frac{5 - 7}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$ <p><math>\therefore d = -\frac{1}{2}</math></p> <p><math>T_3 = 7</math>  <math>a + 2d = 7</math></p>	$1$




ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
32.	$a + 2 \left( -\frac{1}{2} \right) = 7 \quad a - 1 = 7 \quad \therefore a = 8$ $T_n = a + (n - 1) d$ $T_{15} = 8 + \left( 14 \times -\frac{1}{2} \right)$ $= 8 - 7$ $T_{15} = 1$ <p><math>\therefore</math> ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯ 15ನೇ ಪದವು = 1</p> <p><b>ಸೂಚನೆ :</b> ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು.</p> <p>ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ <math>x</math> ಆಗಿರಲಿ</p> <p>ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ = ರೂ. 60</p> <p><math>\therefore</math> ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ = ರೂ. <math>\frac{60}{x}</math></p> <p>ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಂಡಾಗ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = <math>(x + 5)</math></p> <p>ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ = ರೂ. <math>\frac{60}{(x+5)}</math></p> <p>ಆದರೆ, <math>\frac{60}{x} - \frac{60}{(x+5)} = 1</math></p> $\frac{60(x+5) - 60x}{x(x+5)} = 1$ $\frac{60x + 300 - 60x}{x^2 + 5x} = 1$ $x^2 + 5x = 300$ $x^2 + 5x - 300 = 0$ $x^2 + 20x - 15x - 300 = 0$ $x(x+20) - 15(x+20) = 0$ $x = -20 \quad \text{ಅಥವಾ} \quad 15$ <p><math>x = -20</math> ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದರಿಂದ <math>\therefore x = 15</math></p> <p><math>\Rightarrow</math> ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 15</p> <p style="text-align: center;"><b>ಅಥವಾ</b></p>	<p>1</p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math>   3</p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math>   3</p>

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
33.	<p>ಬೇಕಾಗುವ ವರ್ಷಗಳು <math>x</math> ಆಗಿರಲಿ.</p> <p><math>\therefore</math> ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸುಗಳು <math>(11 + x)</math> ಮತ್ತು <math>(14 + x)</math> ಆಗಿರುವುದು.</p> <p>ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಣಲಬ್ಧ = 304</p> $(11 + x)(14 + x) = 304$ $154 + 11x + 14x + x^2 - 304 = 0$ $x^2 + 25x - 150 = 0$ $x^2 + 30x - 5x - 150 = 0$ $x(x + 30) - 5(x + 30) = 0$ $x = 5 \quad \text{ಅಥವಾ} \quad -30$ <p><math>x = -30</math> ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದರಿಂದ</p> $x = 5.$ <p>ಅಂದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳ 304 ಆಗಿರುವುದು.</p> <div data-bbox="662 1070 874 1332" style="text-align: center;">  </div> <p>ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ</p> $\hat{A} = 90^\circ, \quad AB = x, \quad \hat{B} = 45^\circ \quad \Rightarrow \quad \hat{C} = 45^\circ$ $\Rightarrow \quad AB = AC = x$ $BD = CD = \frac{BC}{2}$ $BC^2 = AC^2 + AB^2 \quad \dots \text{ಪೈಥಾಗೊರಸನ ಪ್ರಮೇಯ}$ $= x^2 + x^2$ $BC^2 = 2x^2$ $\therefore \quad BC = x\sqrt{2}$ $AD^2 = CD \cdot BD$ $= \frac{1}{2} BC \cdot \frac{1}{2} BC$	<p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p>3</p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p><math>\frac{1}{2}</math></p>



RF-1017



ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
	$= \left( \frac{BC}{2} \right)^2$ $= \left( \frac{x\sqrt{2}}{2} \right)^2$ $= \frac{x^2 \cdot 2}{4}$ $\therefore AD^2 = \frac{x^2}{2}$ $\therefore AD = \frac{x}{\sqrt{2}}$ <p style="text-align: center;"><b>ಅಥವಾ</b></p>  <p>ಸಾಧನೀಯ : <math>\frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}</math></p> <p>ಸಾಧನೆ : In <math>\Delta ABC</math></p> $CD^2 = AD \cdot BD$ $p^2 = AD \cdot BD \quad \dots (i)$ $CB^2 = AB \cdot AD$ $a^2 = AB \cdot AD \quad \therefore \frac{1}{a^2} = \frac{1}{AB \cdot BD} \quad \dots (ii)$ $AC^2 = AB \cdot AD$ $b^2 = AB \cdot AD \quad \therefore \frac{1}{b^2} = \frac{1}{AB \cdot AD} \quad \dots (iii)$ <p>(ii) ಮತ್ತು (iii) ನ್ನು ಕೂಡುವುದರಿಂದ</p> $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{AB \cdot BD} + \frac{1}{AB \cdot AD}$ $= \frac{1}{AB} \left( \frac{1}{BD} + \frac{1}{AD} \right)$ $= \frac{1}{AB} \left( \frac{AD + BD}{BD \cdot AD} \right) = \frac{1}{AB} \cdot \frac{AB}{p^2} \quad [(i) ರಿಂದ]$ $\therefore \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{p^2}$	<p style="text-align: center;">1</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center;">1/2</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center;">3</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center;">1/2</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center;">1/2</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center;">1/2</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center;">1</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center;">3</p>


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
34.	<p>ಸಾಧನೀಯ : <math>\frac{\sec \theta - \tan \theta}{\sec \theta + \tan \theta} = 1 - 2 \sec \theta \cdot \tan \theta + 2 \tan^2 \theta</math></p> <p>ಸಾಧನೆ : LHS = <math>\frac{\sec \theta - \tan \theta}{\sec \theta + \tan \theta}</math></p> $= \frac{\sec \theta - \tan \theta}{\sec \theta + \tan \theta} \times \frac{\sec \theta - \tan \theta}{\sec \theta - \tan \theta}$ $= \frac{(\sec \theta - \tan \theta)^2}{\sec^2 \theta - \tan^2 \theta}$ $= \frac{\sec^2 \theta + \tan^2 \theta - 2 \sec \theta \cdot \tan \theta}{1} \quad (\because \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1)$ $= \sec^2 \theta + \tan^2 \theta - 2 \sec \theta \cdot \tan \theta$ $= 1 + \tan^2 \theta + \tan^2 \theta - 2 \sec \theta \cdot \tan \theta$ $\quad (\because \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta)$ $= 1 - 2 \sec \theta \cdot \tan \theta + 2 \tan^2 \theta$ $= \text{RHS.}$ <p style="text-align: center;">ಅಥವಾ</p> <p>ಸಾಧನೀಯ : = <math>\sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}}</math></p> <p>ಸಾಧನೆ : RF</p> $= \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \times \frac{1 + \cos \theta}{1 + \cos \theta}}$ $= \sqrt{\frac{(1 + \cos \theta)^2}{1 - \cos^2 \theta}}$ $= \sqrt{\frac{(1 + \cos \theta)^2}{\sin^2 \theta}}$ $= \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$ $= \frac{1}{\sin \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ $= \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$ $= \text{RHS}$	<p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1</p> <p>1/2</p> <p>3</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>3</p>

ಪ್ರಶ್ನೆ  
ಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅಂಕಗಳು

35.



ದತ್ತ : O ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. B ಬಾಹ್ಯಬಿಂದು.

BP ಮತ್ತು BQ ಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ.

ಸಾಧನೀಯ : BP = BQ

ಸಾಧನೆ :  $\Delta BOP$  ಯಲ್ಲಿ  $\hat{BPO} = 90^\circ$

ಇದೇ ರೀತಿ,  $\Delta BOQ$  ಯಲ್ಲಿ  $\hat{BQO} = 90^\circ$

(  $\because$  ಸ್ಪರ್ಶಕ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯ-ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬ )

ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ BOP ಮತ್ತು BOQ ಗಳಲ್ಲಿ,

ಕರ್ಣ BO = ಕರ್ಣ BO .... ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು

OP = OQ ... ತ್ರಿಜ್ಯ

$\therefore \Delta BOP \cong \Delta BOQ$

$\therefore BP = BQ.$

36.

ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ವಕ್ರಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ =  $\frac{1}{3}$  ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$2\pi rh = \frac{1}{3} \cdot 2\pi r (r + h)$$

$$= \frac{1}{3} \times 462$$

$$2\pi rh = 154$$

ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ =  $2\pi (r + h)$

$$462 = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

$$462 = 2\pi r^2 + 154$$

$$462 - 154 = 2\pi r^2$$

★ ★ ★

RF-1017

★ ★ ★

[ Turn over

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$1\frac{1}{2}$  3

$\frac{1}{2}$


$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$








ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು					
39.	<p><math>d = 9</math> ಸೆ.ಮೀ., <math>R = 4</math> ಸೆ.ಮೀ., <math>r = 2</math> ಸೆ.ಮೀ., <math>R - r = 2</math> ಸೆ.ಮೀ.</p> <p><math>AB</math> ಗಳ ರಚಿಸಿ ಮಧ್ಯಬಿಂದು <math>M</math> ಎಳೆದು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ</p> <p><math>C_1</math> <math>C_2</math> <math>C_3</math> ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ</p> <p><math>BK</math>, <math>BL</math>, <math>PQ</math>, <math>RS</math> ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ</p> <p>ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ</p>  <p><math>PQ = RS = 8.7</math> ಸೆ.ಮೀ. ನೇರ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ.</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td rowspan="4">4</td> </tr> <tr> <td>1½</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>½</td> </tr> </table>	1	4	1½	1	½
1	4						
1½							
1							
½							

★ ★ ★

RF-1017

★ ★ ★

[ Turn over

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು																							
40.	$x^2 + x - 6 = 0$ $y = x^2 + x - 6$ ಆಗಿರಲಿ. <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td><math>x</math></td> <td>0</td> <td>1</td> <td>-1</td> <td>2</td> <td>-2</td> <td>3</td> <td>-3</td> <td>-4</td> </tr> <tr> <td><math>y</math></td> <td>-6</td> <td>-4</td> <td>-6</td> <td>0</td> <td>-4</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> </table>  <p style="text-align: right;">ಪಟ್ಟಿ 2 ಪರವಲಯ ನಕ್ಷೆ ರಚನೆ 1 ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 1 ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ 4</p>	$x$	0	1	-1	2	-2	3	-3	-4	$y$	-6	-4	-6	0	-4	6	0	6	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">2</td> <td rowspan="4" style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">4</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">1</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">1</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">1</td> </tr> </table>	2	4	1	1	1
$x$	0	1	-1	2	-2	3	-3	-4																	
$y$	-6	-4	-6	0	-4	6	0	6																	
2	4																								
1																									
1																									
1																									
	<p>ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನ :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ಪಟ್ಟಿ</td> <td style="text-align: right;">1 + 1</td> </tr> <tr> <td>ಪರವಲಯ</td> <td style="text-align: right;"><math>\frac{1}{2}</math></td> </tr> <tr> <td>ಸರಳರೇಖೆ</td> <td style="text-align: right;"><math>\frac{1}{2}</math></td> </tr> <tr> <td>ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ</td> <td style="text-align: right;"><math>\frac{1}{2} + \frac{1}{2}</math></td> </tr> </table>	ಪಟ್ಟಿ	1 + 1	ಪರವಲಯ	$\frac{1}{2}$	ಸರಳರೇಖೆ	$\frac{1}{2}$	ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	4															
ಪಟ್ಟಿ	1 + 1																								
ಪರವಲಯ	$\frac{1}{2}$																								
ಸರಳರೇಖೆ	$\frac{1}{2}$																								
ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$																								


**RF-1017**
